

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	302	217	143	139
ロイシン	1.3%	499	397	255	221
リジン	1.3%	496	199	131	236
メチオニン	0.5%	186	199	124	
シスチン	0.3%	101			
メチオニン・シスチン計	0.8%	289	379	244	161
フェニルアラニン	0.8%	297	271	169	
チロシン	0.6%	232			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	529	434	278	274
スレオニン	0.8%	290	253	161	180
トリプトファン	0.2%	90	83	53	60
バリン	0.9%	355	289	184	146
ヒスチジン	1.0%	373	112	71	68
アルギニン	1.2%	443	199	131	191

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	302	272	250	180	109	151
ロイシン	499	449	440	410	102	110
リジン	496	447	340	360	131	124
メチオニン・シスチン計	289	260	220	160	118	163
フェニルアラニン・チロシン計	529	476	380	390	125	122
スレオニン	290	261	250	210	104	124
トリプトファン	90	81	60	70	135	116
バリン	355	319	310	220	103	145
ヒスチジン	373	336	-	120	-	280
全窒素量(g)	1.1					

