

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	296	217	135	132
ロイシン	1.4%	502	397	242	210
リジン	1.4%	492	199	125	224
メチオニン	0.5%	181	199	117	
シスチン	0.3%	104			
メチオニン・シスチン計	0.8%	287	379	231	153
フェニルアラニン	0.9%	303	271	160	
チロシン	0.7%	236			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	540	434	263	260
スレオニン	0.8%	301	253	153	171
トリプトファン	0.3%	91	83	50	57
バリン	1.0%	364	289	174	139
ヒスチジン	0.8%	274	112	68	64
アルギニン	1.3%	459	199	125	182

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
（mg）						
イソロイシン	296	258	250	180	103	143
ロイシン	502	438	440	410	99	107
リジン	492	429	340	360	126	119
メチオニン・シスチン計	287	251	220	160	114	157
フェニルアラニン・チロシン計	540	471	380	390	124	121
スレオニン	301	262	250	210	105	125
トリプトファン	91	79	60	70	132	113
バリン	364	317	310	220	102	144
ヒスチジン	274	239	-	120	-	199
全窒素量(g)	1.1					

