



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	281	217	122	119
ロイシン	1.5%	480	397	219	190
リジン	1.5%	484	199	113	203
メチオニン	0.5%	165	199	106	
シスチン	0.3%	94			
メチオニン・シスチン計	0.8%	259	379	209	138
フェニルアラニン	0.9%	274	271	145	
チロシン	0.7%	216			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	490	434	238	235
スレオニン	0.9%	274	253	138	154
トリプトファン	0.3%	81	83	45	51
バリン	1.0%	335	289	158	125
ヒスチジン	0.5%	172	112	61	58
アルギニン	1.3%	418	199	113	164

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	281	274	250	180
ロイシン	480	468	440	410	106	114
リジン	484	472	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	259	253	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	490	478	380	390	126	123
スレオニン	274	267	250	210	107	127
トリプトファン	81	79	60	70	131	112
バリン	335	326	310	220	105	148
ヒスチジン	172	168	-	120	-	140
全窒素量(g)	1.0					

