

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	318	217	144	140
ロイシン	1.4%	525	397	257	223
リジン	1.4%	524	199	132	238
メチオニン	0.5%	193	199	125	
シスチン	0.3%	108			
メチオニン・シスチン計	0.8%	303	379	246	163
フェニルアラニン	0.8%	314	271	170	
チロシン	0.6%	245			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	559	434	280	276
スレオニン	0.8%	305	253	163	182
トリプトファン	0.3%	96	83	53	61
バリン	1.0%	376	289	185	147
ヒスチジン	1.0%	385	112	72	68
アルギニン	1.2%	467	199	132	193

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	318	266	250	180
ロイシン	525	440	440	410	100	107
リジン	524	439	340	360	129	122
メチオニン・シスチン計	303	253	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	559	468	380	390	123	120
スレオニン	305	255	250	210	102	122
トリプトファン	96	80	60	70	134	115
バリン	376	314	310	220	101	143
ヒスチジン	385	322	-	120	-	269
全窒素量(g)	1.2					

