

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	319	217	137	133
ロイシン	1.5%	526	397	245	212
リジン	1.5%	532	199	126	227
メチオニン	0.5%	190	199	119	
シスチン	0.3%	107			
メチオニン・シスチン計	0.8%	297	379	234	155
フェニルアラニン	0.9%	314	271	162	
チロシン	0.7%	244			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	558	434	266	263
スレオニン	0.8%	306	253	155	173
トリプトファン	0.3%	95	83	50	58
バリン	1.0%	377	289	176	140
ヒスチジン	1.1%	385	112	68	65
アルギニン	1.3%	452	199	126	183

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	319	267	250	180	107	148
ロイシン	526	440	440	410	100	107
リジン	532	445	340	360	131	124
メチオニン・シスチン計	297	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	558	467	380	390	123	120
スレオニン	306	256	250	210	102	122
トリプトファン	95	80	60	70	133	114
バリン	377	315	310	220	102	143
ヒスチジン	385	322	-	120	-	268
全窒素量(g)	1.2					

