

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	290	217	129	126
ロイシン	1.4%	492	397	231	201
リジン	1.4%	491	199	119	214
メチオニン	0.5%	175	199	112	
シスチン	0.3%	100			
メチオニン・シスチン計	0.8%	277	379	221	146
フェニルアラニン	0.9%	296	271	153	
チロシン	0.7%	231			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	528	434	252	248
スレオニン	0.9%	295	253	146	163
トリプトファン	0.3%	88	83	48	54
バリン	1.0%	356	289	167	133
ヒスチジン	0.8%	270	112	65	61
アルギニン	1.3%	435	199	119	173

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	290	259	250	180	103	144
ロイシン	492	438	440	410	100	107
リジン	491	437	340	360	129	121
メチオニン・シスチン計	277	247	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	528	470	380	390	124	121
スレオニン	295	263	250	210	105	125
トリプトファン	88	79	60	70	131	113
バリン	356	317	310	220	102	144
ヒスチジン	270	241	-	120	-	201
全窒素量(g)	1.1					

