

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	291	217	130	127
ロイシン	1.5%	498	397	233	202
リジン	1.4%	490	199	120	216
メチオニン	0.5%	172	199	113	
シスチン	0.3%	102			
メチオニン・シスチン計	0.8%	274	379	222	147
フェニルアラニン	0.8%	289	271	154	
チロシン	0.7%	226			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	515	434	253	250
スレオニン	0.8%	285	253	147	164
トリプトファン	0.3%	86	83	48	55
バリン	1.0%	351	289	168	133
ヒスチジン	0.5%	181	112	65	62
アルギニン	1.3%	451	199	120	174

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	291	266	250	180
ロイシン	498	455	440	410	103	111
リジン	490	448	340	360	132	124
メチオニン・シスチン計	274	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	515	470	380	390	124	121
スレオニン	285	260	250	210	104	124
トリプトファン	86	79	60	70	131	113
バリン	351	321	310	220	103	146
ヒスチジン	181	165	-	120	-	138
全窒素量(g)	1.1					

