

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	355	217	140
ロイシン	1.6%	601	397	250
リジン	1.6%	587	199	129
メチオニン	0.6%	208	199	121
シスチン	0.3%	122		
メチオニン・シスチン計	0.9%	332	379	239
フェニルアラニン	1.0%	362	271	166
チロシン	0.8%	284		
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	646	434	272
スレオニン	1.0%	352	253	158
トリプトファン	0.3%	108	83	52
バリン	1.2%	430	289	180
ヒスチジン	0.9%	323	112	70
アルギニン	1.5%	541	199	129

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	355	262	250	180
ロイシン	601	443	440	410	101	108
リジン	587	433	340	360	127	120
メチオニン・シスチン計	332	245	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	646	476	380	390	125	122
スレオニン	352	260	250	210	104	124
トリプトファン	108	79	60	70	132	113
バリン	430	317	310	220	102	144
ヒスチジン	323	238	-	120	-	198
全窒素量(g)	1.4					

