



アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	319	217	139	136
ロイシン	1.5%	546	397	249	216
リジン	1.5%	563	199	128	231
メチオニン	0.5%	186	199	121	
シスチン	0.3%	103			
メチオニン・シスチン計	0.8%	291	379	238	158
フェニルアラニン	0.9%	321	271	165	
チロシン	0.7%	250			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	571	434	271	268
スレオニン	0.9%	321	253	158	176
トリプトファン	0.3%	92	83	51	59
バリン	1.0%	375	289	180	143
ヒスチジン	0.7%	257	112	70	66
アルギニン	1.2%	442	199	128	187

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	319	266	250	180
ロイシン	546	456	440	410	104	111
リジン	563	470	340	360	138	131
メチオニン・シスチン計	291	243	220	160	110	152
フェニルアラニン・チロシン計	571	477	380	390	126	122
スレオニン	321	268	250	210	107	127
トリプトファン	92	77	60	70	128	110
バリン	375	313	310	220	101	142
ヒスチジン	257	215	-	120	-	179
全窒素量(g)	1.2					

