

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	305	217	128	124
ロイシン	1.6%	527	397	229	198
リジン	1.6%	526	199	118	212
メチオニン	0.6%	189	199	111	
シスチン	0.3%	103			
メチオニン・シスチン計	0.9%	295	379	219	145
フェニルアラニン	0.9%	308	271	151	
チロシン	0.7%	242			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	550	434	249	246
スレオニン	0.9%	308	253	145	161
トリプトファン	0.3%	91	83	47	54
バリン	1.1%	362	289	165	131
ヒスチジン	0.7%	249	112	64	61
アルギニン	1.4%	471	199	118	172

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	305	264	250	180
ロイシン	527	455	440	410	103	111
リジン	526	454	340	360	134	126
メチオニン・シスチン計	295	254	220	160	116	159
フェニルアラニン・チロシン計	550	475	380	390	125	122
スレオニン	308	266	250	210	106	127
トリプトファン	91	78	60	70	130	112
バリン	362	313	310	220	101	142
ヒスチジン	249	215	-	120	-	179
全窒素量(g)	1.2					

