

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	304	217	132	129
ロイシン	1.4%	501	397	237	206
リジン	1.5%	508	199	122	219
メチオニン	0.5%	184	199	115	
シスチン	0.3%	100			
メチオニン・シスチン計	0.8%	285	379	226	150
フェニルアラニン	0.9%	297	271	157	
チロシン	0.7%	232			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	529	434	258	254
スレオニン	0.8%	292	253	150	167
トリプトファン	0.3%	90	83	49	56
バリン	1.0%	359	289	171	136
ヒスチジン	1.1%	375	112	66	63
アルギニン	1.2%	432	199	122	178

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	304	270	250	180	108	150
ロイシン	501	445	440	410	101	108
リジン	508	451	340	360	133	125
メチオニン・シスチン計	285	253	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	529	470	380	390	124	120
スレオニン	292	259	250	210	104	123
トリプトファン	90	80	60	70	134	115
バリン	359	318	310	220	103	145
ヒスチジン	375	332	-	120	-	277
全窒素量(g)	1.1					

