



アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	乾燥重量ベース
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	
イソロイシン	0.9%	308	217	131	128
ロイシン	1.5%	531	397	235	204
リジン	1.5%	525	199	121	217
メチオニン	0.5%	188	199	114	
シスチン	0.3%	110			
メチオニン・シスチン計	0.9%	299	379	224	148
フェニルアラニン	0.9%	306	271	155	
チロシン	0.7%	248			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	554	434	255	252
スレオニン	0.9%	296	253	148	166
トリプトファン	0.3%	92	83	48	55
バリン	1.1%	363	289	169	135
ヒスチジン	0.6%	201	112	66	62
アルギニン	1.5%	502	199	121	176

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	308	261	250	180
ロイシン	531	449	440	410	102	110
リジン	525	444	340	360	131	123
メチオニン・シスチン計	299	253	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	554	468	380	390	123	120
スレオニン	296	251	250	210	100	119
トリプトファン	92	77	60	70	129	111
バリン	363	306	310	220	99	139
ヒスチジン	201	170	-	120	-	141
全窒素量(g)	1.2					

