

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	290	217	127	124
ロイシン	1.5%	489	397	227	197
リジン	1.4%	484	199	117	211
メチオニン	0.5%	179	199	110	
シスチン	0.3%	109			
メチオニン・シスチン計	0.9%	289	379	217	144
フェニルアラニン	0.9%	291	271	151	
チロシン	0.7%	223			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	514	434	248	244
スレオニン	0.8%	279	253	144	161
トリプトファン	0.3%	95	83	47	54
バリン	1.1%	353	289	164	130
ヒスチジン	1.2%	409	112	64	60
アルギニン	1.3%	424	199	117	171

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	290	253	250	180	101	140
ロイシン	489	426	440	410	97	104
リジン	484	421	340	360	124	117
メチオニン・シスチン計	289	251	220	160	114	157
フェニルアラニン・チロシン計	514	447	380	390	118	115
スレオニン	279	243	250	210	97	116
トリプトファン	95	83	60	70	138	118
バリン	353	307	310	220	99	140
ヒスチジン	409	356	-	120	-	297
全窒素量(g)	1.1					

