

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	302	217	142	138
ロイシン	1.4%	505	397	254	220
リジン	1.4%	513	199	131	235
メチオニン	0.5%	181	199	123	
シスチン	0.3%	106			
メチオニン・シスチン計	0.8%	288	379	243	160
フェニルアラニン	0.8%	298	271	168	
チロシン	0.6%	230			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	528	434	276	272
スレオニン	0.8%	298	253	160	179
トリプトファン	0.2%	91	83	52	60
バリン	1.0%	366	289	183	146
ヒスチジン	0.6%	211	112	71	67
アルギニン	1.3%	475	199	131	190

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	302	263	250	180	105	146
ロイシン	505	438	440	410	100	107
リジン	513	445	340	360	131	124
メチオニン・シスチン計	288	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	528	458	380	390	121	118
スレオニン	298	259	250	210	104	123
トリプトファン	91	79	60	70	131	112
バリン	366	317	310	220	102	144
ヒスチジン	211	183	-	120	-	152
全窒素量(g)	1.2					

