

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	272	217	115	112
ロイシン	1.5%	464	397	206	178
リジン	1.7%	523	199	106	191
メチオニン	0.5%	157	199	100	
シスチン	0.3%	81			
メチオニン・シスチン計	0.8%	240	379	197	130
フェニルアラニン	0.8%	252	271	136	
チロシン	0.7%	208			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	460	434	224	221
スレオニン	0.9%	263	253	130	145
トリプトファン	0.2%	73	83	42	48
バリン	1.0%	314	289	148	118
ヒスチジン	0.6%	173	112	57	54
アルギニン	1.2%	360	199	106	154

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	272	267	250	180
ロイシン	464	454	440	410	103	111
リジン	523	512	340	360	151	142
メチオニン・シスチン計	240	235	220	160	107	147
フェニルアラニン・チロシン計	460	450	380	390	118	115
スレオニン	263	257	250	210	103	122
トリプトファン	73	71	60	70	118	101
バリン	314	308	310	220	99	140
ヒスチジン	173	169	-	120	-	141
全窒素量(g)	1.0					

