



アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	350	217	142	138
ロイシン	1.6%	602	397	254	220
リジン	1.6%	591	199	131	235
メチオニン	0.6%	212	199	123	
シスチン	0.3%	123			
メチオニン・シスチン計	0.9%	337	379	243	161
フェニルアラニン	1.0%	359	271	168	
チロシン	0.7%	279			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	638	434	276	273
スレオニン	0.9%	349	253	161	179
トリプトファン	0.3%	107	83	52	60
バリン	1.1%	419	289	183	146
ヒスチジン	0.7%	280	112	71	67
アルギニン	1.5%	548	199	131	191

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	350	259	250	180
ロイシン	602	445	440	410	101	109
リジン	591	437	340	360	129	122
メチオニン・シスチン計	337	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	638	472	380	390	124	121
スレオニン	349	258	250	210	103	123
トリプトファン	107	79	60	70	131	113
バリン	419	310	310	220	100	141
ヒスチジン	280	207	-	120	-	173
全窒素量(g)	1.4					

