

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	305	217	140	137
ロイシン	1.4%	508	397	251	218
リジン	1.4%	527	199	129	233
メチオニン	0.5%	174	199	122	
シスチン	0.3%	102			
メチオニン・シスチン計	0.7%	277	379	240	159
フェニルアラニン	0.8%	302	271	166	
チロシン	0.6%	232			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	534	434	274	270
スレオニン	0.8%	300	253	159	177
トリプトファン	0.2%	89	83	52	59
バリン	1.0%	365	289	181	144
ヒスチジン	0.6%	211	112	70	67
アルギニン	1.2%	440	199	129	189

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	305	268	250	180	107	149
ロイシン	508	446	440	410	101	109
リジン	527	463	340	360	136	129
メチオニン・シスチン計	277	243	220	160	110	152
フェニルアラニン・チロシン計	534	469	380	390	123	120
スレオニン	300	264	250	210	106	126
トリプトファン	89	78	60	70	130	111
バリン	365	320	310	220	103	146
ヒスチジン	211	185	-	120	-	154
全窒素量(g)	1.1					

