

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	284	217	153
ロイシン	1.1%	472	397	244
リジン	1.2%	495	199	261
メチオニン	0.4%	174	199	137
シスチン	0.2%	95		
メチオニン・シスチン計	0.7%	270	379	269
フェニルアラニン	0.7%	274	271	186
チロシン	0.5%	209		
フェニルアラニン・チロシン計	1.2%	483	434	307
スレオニン	0.7%	287	253	178
トリプトファン	0.2%	82	83	58
バリン	0.8%	342	289	203
ヒスチジン	0.5%	198	112	79
アルギニン	1.0%	430	199	145

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	284	268	250	180
ロイシン	472	446	440	410	101	109
リジン	495	468	340	360	138	130
メチオニン・シスチン計	270	255	220	160	116	159
フェニルアラニン・チロシン計	483	456	380	390	120	117
スレオニン	287	271	250	210	108	129
トリプトファン	82	77	60	70	128	110
バリン	342	323	310	220	104	147
ヒスチジン	198	187	-	120	-	156
全窒素量(g)	1.1					

