

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	289	217	124	121
ロイシン	1.5%	478	397	222	192
リジン	1.6%	516	199	114	205
メチオニン	0.5%	149	199	108	
シスチン	0.3%	84			
メチオニン・シスチン計	0.7%	231	379	212	140
フェニルアラニン	0.8%	263	271	147	
チロシン	0.6%	205			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	469	434	241	238
スレオニン	0.9%	280	253	140	156
トリプトファン	0.2%	79	83	46	52
バリン	1.0%	325	289	160	127
ヒスチジン	0.8%	272	112	62	59
アルギニン	1.2%	375	199	114	166

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	289	285	250	180
ロイシン	478	472	440	410	107	115
リジン	516	509	340	360	150	142
メチオニン・シスチン計	231	228	220	160	104	143
フェニルアラニン・チロシン計	469	462	380	390	122	119
スレオニン	280	276	250	210	111	132
トリプトファン	79	78	60	70	130	111
バリン	325	320	310	220	103	146
ヒスチジン	272	268	-	120	-	224
全窒素量(g)	1.0					

