

ver.4 このレシピのエネルギー		128	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.90	日分となります							
参考の表へ		1日与えるエネルギー	142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする						
		6/12(thu)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2				
		グラム	総重量				NRC			老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より		疾患別推奨レベル		NRC		
			水分				体重0.75乗ベース			↓この範囲内！		↓この範囲内！		体重0.75乗ベース		
			乾燥重量							3.0 ~ 4.0		~				
			エネルギー													
			エネルギー密度													
魚介類		まいわし-焼き														
豆類		糸引き納豆														
いも類		さつまいも-蒸し														
野菜類		キャベツ-生														
野菜類		ブロッコリー・花序-ゆで														
野菜類		アスパラガス・若茎-ゆで														
野菜類		こまつな・葉-ゆで														
きのこ類		まいたけ-ゆで														
野菜類		かぼちゃ(日本)-ゆで														
野菜類		トマト-生														
種実類		ごま-いり														
果実類		ブルーベリー-生														
魚介類		まいわし-焼き														
豆類		糸引き納豆														
いも類		さつまいも-蒸し														
野菜類		キャベツ-生														
野菜類		ブロッコリー・花序-ゆで														
野菜類		アスパラガス・若茎-ゆで														
野菜類		こまつな・葉-ゆで														
きのこ類		まいたけ-ゆで														
野菜類		かぼちゃ(日本)-ゆで														
野菜類		トマト-生														
種実類		ごま-いり														
果実類		ブルーベリー-生														

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	309	217	143	139
ロイシン	1.4%	521	397	255	221
リジン	1.4%	523	199	131	236
メチオニン	0.5%	172	199	124	
シスチン	0.3%	101			
メチオニン・シスチン計	0.7%	272	379	244	161
フェニルアラニン	0.8%	315	271	169	
チロシン	0.6%	237			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	552	434	278	274
スレオニン	0.8%	309	253	161	180
トリプトファン	0.2%	92	83	53	60
バリン	1.0%	373	289	184	146
ヒスチジン	0.7%	280	112	71	68
アルギニン	1.1%	429	199	131	191

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	309	260	250	180	104	144
ロイシン	521	438	440	410	100	107
リジン	523	440	340	360	129	122
メチオニン・シスチン計	272	229	220	160	104	143
フェニルアラニン・チロシン計	552	465	380	390	122	119
スレオニン	309	260	250	210	104	124
トリプトファン	92	77	60	70	129	110
バリン	373	314	310	220	101	143
ヒスチジン	280	236	-	120	-	196
全窒素量(g)	1.2					

