

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	269	217	143	139
ロイシン	1.2%	451	397	256	222
リジン	1.0%	360	199	132	237
メチオニン	0.4%	150	199	124	
シスチン	0.3%	129			
メチオニン・シスチン計	0.7%	279	379	244	162
フェニルアラニン	0.8%	292	271	169	
チロシン	0.6%	212			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	504	434	278	274
スレオニン	0.7%	246	253	162	180
トリプトファン	0.2%	87	83	53	60
バリン	0.9%	339	289	184	147
ヒスチジン	0.4%	159	112	71	68
アルギニン	1.1%	417	199	132	192

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	269	276	250	180	110	153
ロイシン	451	463	440	410	105	113
リジン	360	369	340	360	109	103
メチオニン・シスチン計	279	287	220	160	130	179
フェニルアラニン・チロシン計	504	517	380	390	136	132
スレオニン	246	253	250	210	101	120
トリプトファン	87	89	60	70	148	127
バリン	339	348	310	220	112	158
ヒスチジン	159	163	-	120	-	136
全窒素量(g)	1.0					

