

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
	/DM	mg			
イソロイシン	1.0%	297	217	112	109
ロイシン	1.7%	494	397	200	174
リジン	1.8%	527	199	103	185
メチオニン	0.5%	151	199	97	
シスチン	0.3%	85			
メチオニン・シスチン計	0.8%	235	379	191	126
フェニルアラニン	0.9%	275	271	132	
チロシン	0.7%	216			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	490	434	218	215
スレオニン	1.0%	287	253	126	141
トリプトファン	0.3%	81	83	41	47
バリン	1.1%	332	289	144	115
ヒスチジン	0.9%	277	112	56	53
アルギニン	1.3%	381	199	103	150

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	297	291	250	180	117	162
ロイシン	494	484	440	410	110	118
リジン	527	517	340	360	152	143
メチオニン・シスチン計	235	231	220	160	105	144
フェニルアラニン・チロシン計	490	480	380	390	126	123
スレオニン	287	281	250	210	112	134
トリプトファン	81	79	60	70	132	113
バリン	332	325	310	220	105	148
ヒスチジン	277	271	-	120	-	226
全窒素量(g)	1.0					

