

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	321	217	143
ロイシン	1.4%	537	397	257
リジン	1.4%	527	199	132
メチオニン	0.5%	172	199	125
シスチン	0.3%	108		
メチオニン・シスチン計	0.7%	279	379	245
フェニルアラニン	0.8%	314	271	170
チロシン	0.6%	241		
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	554	434	279
スレオニン	0.8%	311	253	162
トリプトファン	0.3%	94	83	53
バリン	1.0%	368	289	185
ヒスチジン	0.8%	284	112	72
アルギニン	1.3%	475	199	132

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	321	276	250	180
ロイシン	537	462	440	410	105	113
リジン	527	453	340	360	133	126
メチオニン・シスチン計	279	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	554	477	380	390	126	122
スレオニン	311	268	250	210	107	128
トリプトファン	94	81	60	70	136	116
バリン	368	317	310	220	102	144
ヒスチジン	284	245	-	120	-	204
全窒素量(g)	1.2					

