

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	311	217	126	122
ロイシン	1.6%	522	397	225	195
リジン	1.6%	540	199	116	208
メチオニン	0.5%	153	199	109	
シスチン	0.3%	98			
メチオニン・シスチン計	0.8%	249	379	215	142
フェニルアラニン	0.9%	304	271	149	
チロシン	0.7%	225			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	528	434	244	241
スレオニン	0.9%	295	253	142	159
トリプトファン	0.3%	86	83	46	53
バリン	1.1%	352	289	162	129
ヒスチジン	0.8%	279	112	63	59
アルギニン	1.2%	407	199	116	168

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	311	281	250	180
ロイシン	522	472	440	410	107	115
リジン	540	488	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	249	225	220	160	102	141
フェニルアラニン・チロシン計	528	477	380	390	126	122
スレオニン	295	266	250	210	107	127
トリプトファン	86	77	60	70	129	111
バリン	352	318	310	220	103	144
ヒスチジン	279	252	-	120	-	210
全窒素量(g)	1.1					

