

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	247	217	129	126
ロイシン	1.2%	415	397	231	201
リジン	1.3%	426	199	119	214
メチオニン	0.5%	156	199	112	
シスチン	0.3%	88			
メチオニン・シスチン計	0.7%	244	379	221	146
フェニルアラニン	0.7%	254	271	153	
チロシン	0.6%	200			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	456	434	252	248
スレオニン	0.7%	250	253	146	163
トリプトファン	0.2%	73	83	48	54
バリン	0.9%	296	289	167	133
ヒスチジン	0.4%	153	112	65	61
アルギニン	1.1%	383	199	119	174

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	247	467	250	180
ロイシン	415	784	440	410	178	191
リジン	426	804	340	360	236	223
メチオニン・シスチン計	244	461	220	160	210	288
フェニルアラニン・チロシン計	456	861	380	390	227	221
スレオニン	250	471	250	210	188	224
トリプトファン	73	137	60	70	229	196
バリン	296	559	310	220	180	254
ヒスチジン	153	289	-	120	-	241
全窒素量(g)	0.5					

