

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	359	217	141	137
ロイシン	1.6%	602	397	252	218
リジン	1.6%	585	199	130	233
メチオニン	0.5%	203	199	122	
シスチン	0.3%	127			
メチオニン・シスチン計	0.9%	331	379	241	159
フェニルアラニン	1.0%	361	271	167	
チロシン	0.7%	276			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	636	434	274	270
スレオニン	0.9%	340	253	159	178
トリプトファン	0.3%	102	83	52	59
バリン	1.1%	415	289	181	144
ヒスチジン	0.7%	245	112	70	67
アルギニン	1.4%	516	199	130	189

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	359	295	250	180	118	164
ロイシン	602	495	440	410	112	121
リジン	585	481	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	331	272	220	160	124	170
フェニルアラニン・チロシン計	636	523	380	390	138	134
スレオニン	340	280	250	210	112	133
トリプトファン	102	84	60	70	140	120
バリン	415	341	310	220	110	155
ヒスチジン	245	202	-	120	-	168
全窒素量(g)	1.2					

