



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	376	217	166	161
ロイシン	1.4%	628	397	296	257
リジン	1.2%	544	199	152	274
メチオニン	0.5%	215	199	144	
シスチン	0.3%	151			
メチオニン・シスチン計	0.9%	371	379	283	187
フェニルアラニン	0.9%	394	271	196	
チロシン	0.7%	286			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	678	434	322	318
スレオニン	0.8%	344	253	187	209
トリプトファン	0.3%	111	83	61	70
バリン	1.0%	434	289	213	170
ヒスチジン	1.0%	418	112	83	78
アルギニン	1.1%	500	199	152	222

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	376	312	250	180
ロイシン	628	521	440	410	118	127
リジン	544	451	340	360	133	125
メチオニン・シスチン計	371	308	220	160	140	192
フェニルアラニン・チロシン計	678	563	380	390	148	144
スレオニン	344	286	250	210	114	136
トリプトファン	111	92	60	70	154	132
バリン	434	360	310	220	116	164
ヒスチジン	418	347	-	120	-	289
全窒素量(g)	1.2					

