

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	319	217	153
ロイシン	1.3%	556	397	244
リジン	1.2%	513	199	261
メチオニン	0.5%	194	199	137
シスチン	0.3%	108		
メチオニン・シスチン計	0.7%	304	379	269
フェニルアラニン	0.8%	317	271	186
チロシン	0.6%	245		
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	562	434	306
スレオニン	0.7%	305	253	178
トリプトファン	0.2%	92	83	58
バリン	0.9%	380	289	203
ヒスチジン	0.9%	383	112	79
アルギニン	1.1%	446	199	145

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	319	266	250	180
ロイシン	556	463	440	410	105	113
リジン	513	427	340	360	126	119
メチオニン・シスチン計	304	253	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	562	468	380	390	123	120
スレオニン	305	254	250	210	102	121
トリプトファン	92	77	60	70	128	110
バリン	380	317	310	220	102	144
ヒスチジン	383	319	-	120	-	266
全窒素量(g)	1.2					

