

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	369	217	158	153
ロイシン	1.5%	641	397	282	245
リジン	1.4%	576	199	145	261
メチオニン	0.5%	213	199	137	
シスチン	0.3%	127			
メチオニン・シスチン計	0.8%	341	379	269	178
フェニルアラニン	0.9%	372	271	187	
チロシン	0.7%	287			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	659	434	307	303
スレオニン	0.8%	344	253	178	199
トリプトファン	0.3%	108	83	58	66
バリン	1.0%	435	289	203	162
ヒスチジン	1.0%	414	112	79	75
アルギニン	1.3%	534	199	145	211

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	369	268	250	180	107	149
ロイシン	641	465	440	410	106	113
リジン	576	418	340	360	123	116
メチオニン・シスチン計	341	247	220	160	112	155
フェニルアラニン・チロシン計	659	478	380	390	126	123
スレオニン	344	249	250	210	100	119
トリプトファン	108	78	60	70	131	112
バリン	435	315	310	220	102	143
ヒスチジン	414	300	-	120	-	250
全窒素量(g)	1.4					

