

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	
	/DM	mg			
イソロイシン	0.9%	298	217	126	123
ロイシン	1.5%	504	397	226	196
リジン	1.5%	499	199	116	210
メチオニン	0.5%	174	199	110	
シスチン	0.3%	100			
メチオニン・シスチン計	0.8%	273	379	216	143
フェニルアラニン	0.9%	292	271	150	
チロシン	0.7%	237			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	529	434	246	243
スレオニン	0.9%	297	253	143	160
トリプトファン	0.3%	90	83	47	53
バリン	1.1%	353	289	163	130
ヒスチジン	1.2%	406	112	63	60
アルギニン	1.3%	434	199	116	170

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	298	257	250	180	103	143
ロイシン	504	434	440	410	99	106
リジン	499	430	340	360	126	119
メチオニン・シスチン計	273	235	220	160	107	147
フェニルアラニン・チロシン計	529	455	380	390	120	117
スレオニン	297	256	250	210	102	122
トリプトファン	90	77	60	70	129	111
バリン	353	304	310	220	98	138
ヒスチジン	406	350	-	120	-	292
全窒素量(g)	1.2					

