

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	
	/DM	mg			
イソロイシン	0.8%	305	217	149	145
ロイシン	1.3%	516	397	267	232
リジン	1.3%	505	199	137	247
メチオニン	0.5%	184	199	130	
シスチン	0.3%	109			
メチオニン・シスチン計	0.8%	295	379	255	169
フェニルアラニン	0.8%	314	271	177	
チロシン	0.6%	243			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	557	434	291	287
スレオニン	0.8%	310	253	169	188
トリプトファン	0.2%	94	83	55	63
バリン	1.0%	374	289	192	153
ヒスチジン	0.7%	280	112	75	71
アルギニン	1.2%	469	199	137	200

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	305	255	250	180	102	142
ロイシン	516	432	440	410	98	105
リジン	505	423	340	360	124	118
メチオニン・シスチン計	295	247	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	557	467	380	390	123	120
スレオニン	310	260	250	210	104	124
トリプトファン	94	79	60	70	131	112
バリン	374	313	310	220	101	142
ヒスチジン	280	235	-	120	-	196
全窒素量(g)	1.2					

