

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	325	217	148	144
ロイシン	1.4%	549	397	264	229
リジン	1.4%	553	199	136	245
メチオニン	0.5%	196	199	128	
シスチン	0.3%	111			
メチオニン・シスチン計	0.8%	309	379	252	167
フェニルアラニン	0.9%	331	271	175	
チロシン	0.7%	256			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	587	434	287	283
スレオニン	0.9%	333	253	167	186
トリプトファン	0.3%	98	83	54	62
バリン	1.0%	399	289	190	151
ヒスチジン	0.8%	305	112	74	70
アルギニン	1.2%	477	199	136	198

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	325	258	250	180
ロイシン	549	436	440	410	99	106
リジン	553	439	340	360	129	122
メチオニン・シスチン計	309	245	220	160	112	153
フェニルアラニン・チロシン計	587	466	380	390	123	120
スレオニン	333	265	250	210	106	126
トリプトファン	98	78	60	70	129	111
バリン	399	317	310	220	102	144
ヒスチジン	305	242	-	120	-	202
全窒素量(g)	1.3					

