

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	327	217	156	152
ロイシン	1.4%	561	397	279	242
リジン	1.4%	562	199	144	259
メチオニン	0.5%	191	199	135	
シスチン	0.3%	111			
メチオニン・シスチン計	0.7%	304	379	267	176
フェニルアラニン	0.8%	333	271	185	
チロシン	0.6%	261			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	594	434	304	300
スレオニン	0.8%	327	253	176	197
トリプトファン	0.2%	97	83	57	66
バリン	0.9%	388	289	201	160
ヒスチジン	0.6%	261	112	78	74
アルギニン	1.2%	478	199	144	209

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	327	265	250	180	106	147
ロイシン	561	453	440	410	103	111
リジン	562	454	340	360	134	126
メチオニン・シスチン計	304	246	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	594	480	380	390	126	123
スレオニン	327	264	250	210	106	126
トリプトファン	97	79	60	70	131	112
バリン	388	314	310	220	101	143
ヒスチジン	261	211	-	120	-	176
全窒素量(g)	1.2					

