



アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	324	217	142
ロイシン	1.4%	538	397	254
リジン	1.5%	557	199	131
メチオニン	0.4%	164	199	123
シスチン	0.3%	100		
メチオニン・シスチン計	0.7%	262	379	243
フェニルアラニン	0.8%	306	271	168
チロシン	0.6%	237		
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	542	434	276
スレオニン	0.8%	311	253	161
トリプトファン	0.2%	90	83	52
バリン	1.0%	363	289	183
ヒスチジン	0.8%	294	112	71
アルギニン	1.1%	417	199	131

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	324	289	250	180
ロイシン	538	479	440	410	109	117
リジン	557	496	340	360	146	138
メチオニン・シスチン計	262	234	220	160	106	146
フェニルアラニン・チロシン計	542	483	380	390	127	124
スレオニン	311	277	250	210	111	132
トリプトファン	90	80	60	70	134	115
バリン	363	324	310	220	104	147
ヒスチジン	294	262	-	120	-	219
全窒素量(g)	1.1					

