

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	422	217	171	166
ロイシン	1.6%	710	397	306	265
リジン	1.6%	727	199	157	283
メチオニン	0.6%	256	199	148	
シスチン	0.3%	139			
メチオニン・シスチン計	0.9%	399	379	292	193
フェニルアラニン	0.9%	422	271	202	
チロシン	0.7%	329			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	751	434	333	328
スレオニン	1.0%	430	253	193	216
トリプトファン	0.3%	123	83	63	72
バリン	1.1%	512	289	220	175
ヒスチジン	0.9%	406	112	85	81
アルギニン	1.3%	596	199	157	229

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	422	264	250	180	106	147
ロイシン	710	445	440	410	101	108
リジン	727	456	340	360	134	127
メチオニン・シスチン計	399	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	751	471	380	390	124	121
スレオニン	430	269	250	210	108	128
トリプトファン	123	77	60	70	129	110
バリン	512	321	310	220	104	146
ヒスチジン	406	254	-	120	-	212
全窒素量(g)	1.6					

