

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	372	217	157	153
ロイシン	1.5%	630	397	281	244
リジン	1.5%	624	199	145	260
メチオニン	0.6%	230	199	136	
シスチン	0.3%	129			
メチオニン・シスチン計	0.9%	361	379	268	178
フェニルアラニン	0.9%	379	271	186	
チロシン	0.7%	295			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	675	434	306	302
スレオニン	0.9%	379	253	178	198
トリプトファン	0.3%	113	83	58	66
バリン	1.1%	456	289	202	161
ヒスチジン	0.8%	350	112	78	74
アルギニン	1.4%	572	199	145	211

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	372	257	250	180	103	143
ロイシン	630	435	440	410	99	106
リジン	624	431	340	360	127	120
メチオニン・シスチン計	361	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	675	466	380	390	123	120
スレオニン	379	262	250	210	105	125
トリプトファン	113	78	60	70	130	112
バリン	456	315	310	220	102	143
ヒスチジン	350	242	-	120	-	202
全窒素量(g)	1.4					

