



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	339	217	157	153
ロイシン	1.3%	551	397	282	244
リジン	1.4%	593	199	145	261
メチオニン	0.5%	193	199	137	
シスチン	0.2%	103			
メチオニン・シスチン計	0.7%	298	379	269	178
フェニルアラニン	0.8%	326	271	186	
チロシン	0.6%	249			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	575	434	306	302
スレオニン	0.8%	326	253	178	199
トリプトファン	0.2%	95	83	58	66
バリン	1.0%	394	289	203	161
ヒスチジン	1.0%	432	112	79	75
アルギニン	1.0%	401	199	145	211

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	339	278	250	180
ロイシン	551	452	440	410	103	110
リジン	593	487	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	298	244	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	575	472	380	390	124	121
スレオニン	326	268	250	210	107	127
トリプトファン	95	78	60	70	130	111
バリン	394	323	310	220	104	147
ヒスチジン	432	354	-	120	-	295
全窒素量(g)	1.2					

