

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	301	217	136	132
ロイシン	1.4%	498	397	243	211
リジン	1.5%	545	199	125	225
メチオニン	0.5%	166	199	118	
シスチン	0.3%	92			
メチオニン・シスチン計	0.7%	258	379	233	154
フェニルアラニン	0.8%	290	271	161	
チロシン	0.6%	224			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	514	434	265	261
スレオニン	0.8%	295	253	154	172
トリプトファン	0.2%	81	83	50	57
バリン	1.0%	348	289	175	140
ヒスチジン	0.6%	208	112	68	64
アルギニン	1.1%	377	199	125	182

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	301	285	250	180
ロイシン	498	472	440	410	107	115
リジン	545	516	340	360	152	143
メチオニン・シスチン計	258	244	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	514	487	380	390	128	125
スレオニン	295	279	250	210	112	133
トリプトファン	81	76	60	70	127	109
バリン	348	330	310	220	106	150
ヒスチジン	208	197	-	120	-	164
全窒素量(g)	1.1					

