

| アミノ酸(参考) | | | | |
|----------------|--------------|-----|------------|---------|
| | このレシビで摂取できる量 | | このレシビでの推奨量 | |
| | /DM | mg | NRC | |
| | | | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース |
| イソロイシン | 0.9% | 348 | 217 | 153 |
| ロイシン | 1.5% | 590 | 397 | 274 |
| リジン | 1.5% | 597 | 199 | 141 |
| メチオニン | 0.5% | 198 | 199 | 133 |
| シスチン | 0.3% | 116 | | |
| メチオニン・シスチン計 | 0.8% | 317 | 379 | 262 |
| フェニルアラニン | 0.9% | 355 | 271 | 181 |
| チロシン | 0.7% | 267 | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 1.5% | 622 | 434 | 298 |
| スレオニン | 0.9% | 349 | 253 | 173 |
| トリプトファン | 0.2% | 98 | 83 | 56 |
| バリン | 1.0% | 418 | 289 | 197 |
| ヒスチジン | 0.8% | 330 | 112 | 77 |
| アルギニン | 1.1% | 429 | 199 | 141 |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| このレシビで摂取できる量 (mg) | 窒素1gあたりの アミノ酸量 | 算定用評点パターン | | アミノ酸スコアを計算する(%) | | |
| | | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | |
| | | イソロイシン | 348 | 265 | 250 | 180 |
| ロイシン | 590 | 449 | 440 | 410 | 102 | 110 |
| リジン | 597 | 455 | 340 | 360 | 134 | 126 |
| メチオニン・シスチン計 | 317 | 242 | 220 | 160 | 110 | 151 |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 622 | 474 | 380 | 390 | 125 | 121 |
| スレオニン | 349 | 266 | 250 | 210 | 106 | 127 |
| トリプトファン | 98 | 75 | 60 | 70 | 124 | 107 |
| バリン | 418 | 318 | 310 | 220 | 103 | 145 |
| ヒスチジン | 330 | 251 | - | 120 | - | 209 |
| 全窒素量(g) | 1.3 | | | | | |

