

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	345	217	153
ロイシン	1.4%	578	397	243
リジン	1.5%	607	199	144
メチオニン	0.5%	200	199	136
シスチン	0.3%	111		
メチオニン・シスチン計	0.8%	314	379	268
フェニルアラニン	0.8%	347	271	186
チロシン	0.6%	265		
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	612	434	305
スレオニン	0.9%	354	253	177
トリプトファン	0.2%	100	83	58
バリン	1.0%	419	289	202
ヒスチジン	0.8%	330	112	78
アルギニン	1.1%	453	199	144

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	345	263	250	180
ロイシン	578	441	440	410	100	108
リジン	607	464	340	360	136	129
メチオニン・シスチン計	314	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	612	468	380	390	123	120
スレオニン	354	270	250	210	108	129
トリプトファン	100	76	60	70	127	109
バリン	419	320	310	220	103	145
ヒスチジン	330	252	-	120	-	210
全窒素量(g)	1.3					

