

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	395	217	160	155
ロイシン	1.6%	666	397	286	248
リジン	1.6%	659	199	147	265
メチオニン	0.6%	232	199	139	
シスチン	0.3%	137			
メチオニン・シスチン計	0.9%	372	379	273	181
フェニルアラニン	1.0%	404	271	189	
チロシン	0.7%	311			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	715	434	311	307
スレオニン	0.9%	396	253	181	202
トリプトファン	0.3%	119	83	59	67
バリン	1.1%	479	289	206	164
ヒスチジン	0.9%	364	112	80	76
アルギニン	1.4%	584	199	147	214

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	395	259	250	180	104	144
ロイシン	666	437	440	410	99	107
リジン	659	433	340	360	127	120
メチオニン・シスチン計	372	244	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	715	470	380	390	124	120
スレオニン	396	260	250	210	104	124
トリプトファン	119	78	60	70	131	112
バリン	479	314	310	220	101	143
ヒスチジン	364	239	-	120	-	199
全窒素量(g)	1.5					

