

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	337	217	165	160
ロイシン	1.3%	555	397	294	256
リジン	1.3%	542	199	152	273
メチオニン	0.5%	197	199	143	
シスチン	0.3%	118			
メチオニン・シスチン計	0.7%	317	379	281	186
フェニルアラニン	0.8%	338	271	195	
チロシン	0.6%	256			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	594	434	320	316
スレオニン	0.7%	322	253	186	208
トリプトファン	0.2%	101	83	61	69
バリン	0.9%	398	289	212	169
ヒスチジン	0.9%	394	112	82	78
アルギニン	1.1%	464	199	152	221

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	337	276	250	180	111	154
ロイシン	555	455	440	410	103	111
リジン	542	445	340	360	131	124
メチオニン・シスチン計	317	260	220	160	118	162
フェニルアラニン・チロシン計	594	487	380	390	128	125
スレオニン	322	264	250	210	106	126
トリプトファン	101	82	60	70	137	118
バリン	398	326	310	220	105	148
ヒスチジン	394	323	-	120	-	270
全窒素量(g)	1.2					

