

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
	/DM	mg			
イソロイシン	0.9%	362	217	155	151
ロイシン	1.5%	596	397	278	241
リジン	1.4%	592	199	143	257
メチオニン	0.5%	214	199	135	
シスチン	0.3%	124			
メチオニン・シスチン計	0.8%	340	379	266	176
フェニルアラニン	0.9%	359	271	184	
チロシン	0.7%	275			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	634	434	302	298
スレオニン	0.8%	344	253	176	196
トリプトファン	0.3%	108	83	57	65
バリン	1.0%	424	289	200	159
ヒスチジン	1.1%	437	112	78	74
アルギニン	1.2%	503	199	143	208

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	362	275	250	180	110	153
ロイシン	596	454	440	410	103	111
リジン	592	451	340	360	133	125
メチオニン・シスチン計	340	259	220	160	118	162
フェニルアラニン・チロシン計	634	482	380	390	127	124
スレオニン	344	262	250	210	105	125
トリプトファン	108	82	60	70	136	117
バリン	424	323	310	220	104	147
ヒスチジン	437	333	-	120	-	277
全窒素量(g)	1.3					

