

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	359	217	152	148
ロイシン	1.5%	607	397	272	236
リジン	1.5%	610	199	140	252
メチオニン	0.5%	217	199	132	
シスチン	0.3%	122			
メチオニン・シスチン計	0.9%	342	379	260	172
フェニルアラニン	0.9%	365	271	180	
チロシン	0.7%	282			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	647	434	296	292
スレオニン	0.9%	366	253	172	192
トリプトファン	0.3%	107	83	56	64
バリン	1.1%	438	289	196	156
ヒスチジン	0.8%	340	112	76	72
アルギニン	1.3%	520	199	140	204

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	359	264	250	180	106	147
ロイシン	607	445	440	410	101	109
リジン	610	448	340	360	132	124
メチオニン・シスチン計	342	251	220	160	114	157
フェニルアラニン・チロシン計	647	475	380	390	125	122
スレオニン	366	268	250	210	107	128
トリプトファン	107	79	60	70	131	112
バリン	438	322	310	220	104	146
ヒスチジン	340	250	-	120	-	208
全窒素量(g)	1.4					

