

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	365	217	162	158
ロイシン	1.5%	619	397	290	252
リジン	1.5%	619	199	149	269
メチオニン	0.5%	216	199	141	
シスチン	0.3%	125			
メチオニン・シスチン計	0.8%	343	379	277	183
フェニルアラニン	0.9%	374	271	192	
チロシン	0.7%	281			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	655	434	316	311
スレオニン	0.9%	365	253	183	205
トリプトファン	0.3%	109	83	60	68
バリン	1.0%	442	289	209	166
ヒスチジン	0.8%	354	112	81	77
アルギニン	1.2%	532	199	149	218

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	365	258	250	180	103	143
ロイシン	619	437	440	410	99	107
リジン	619	437	340	360	129	121
メチオニン・シスチン計	343	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	655	463	380	390	122	119
スレオニン	365	258	250	210	103	123
トリプトファン	109	77	60	70	128	110
バリン	442	312	310	220	101	142
ヒスチジン	354	250	-	120	-	208
全窒素量(g)	1.4					

