



アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	363	217	168	163
ロイシン	1.4%	597	397	300	261
リジン	1.3%	594	199	155	278
メチオニン	0.5%	215	199	146	
シスチン	0.3%	125			
メチオニン・シスチン計	0.8%	342	379	287	190
フェニルアラニン	0.8%	360	271	199	
チロシン	0.6%	275			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	635	434	327	322
スレオニン	0.8%	347	253	190	212
トリプトファン	0.2%	108	83	62	71
バリン	1.0%	425	289	216	172
ヒスチジン	1.0%	438	112	84	79
アルギニン	1.1%	502	199	155	225

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	363	273	250	180
ロイシン	597	449	440	410	102	109
リジン	594	447	340	360	131	124
メチオニン・シスチン計	342	257	220	160	117	161
フェニルアラニン・チロシン計	635	477	380	390	126	122
スレオニン	347	261	250	210	104	124
トリプトファン	108	81	60	70	135	116
バリン	425	320	310	220	103	145
ヒスチジン	438	330	-	120	-	275
全窒素量(g)	1.3					

