

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	329	217	142	138
ロイシン	1.5%	551	397	254	221
リジン	1.6%	590	199	131	236
メチオニン	0.5%	193	199	123	
シスチン	0.3%	103			
メチオニン・シスチン計	0.8%	299	379	243	161
フェニルアラニン	0.9%	327	271	168	
チロシン	0.7%	254			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	582	434	277	273
スレオニン	0.9%	338	253	161	180
トリプトファン	0.3%	95	83	52	60
バリン	1.1%	397	289	183	146
ヒスチジン	0.9%	320	112	71	67
アルギニン	1.2%	435	199	131	191

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（％）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	329	259	250	180	104	144
ロイシン	551	434	440	410	99	106
リジン	590	465	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	299	235	220	160	107	147
フェニルアラニン・チロシン計	582	458	380	390	121	118
スレオニン	338	266	250	210	106	127
トリプトファン	95	75	60	70	125	107
バリン	397	313	310	220	101	142
ヒスチジン	320	252	-	120	-	210
全窒素量(g)	1.3					

