

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	331	217	137	134
ロイシン	1.5%	541	397	246	213
リジン	1.6%	573	199	127	228
メチオニン	0.5%	189	199	119	
シスチン	0.3%	104			
メチオニン・シスチン計	0.8%	295	379	235	155
フェニルアラニン	0.9%	321	271	163	
チロシン	0.7%	249			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	569	434	268	264
スレオニン	0.9%	315	253	155	174
トリプトファン	0.3%	95	83	51	58
バリン	1.1%	383	289	177	141
ヒスチジン	1.2%	417	112	69	65
アルギニン	1.1%	415	199	127	184

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	331	276	250	180	110	153
ロイシン	541	451	440	410	102	110
リジン	573	477	340	360	140	132
メチオニン・シスチン計	295	246	220	160	112	153
フェニルアラニン・チロシン計	569	474	380	390	125	122
スレオニン	315	262	250	210	105	125
トリプトファン	95	79	60	70	131	113
バリン	383	319	310	220	103	145
ヒスチジン	417	347	-	120	-	289
全窒素量(g)	1.2					

