

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	351	217	151	147
ロイシン	1.5%	591	397	270	234
リジン	1.5%	606	199	139	250
メチオニン	0.5%	205	199	131	
シスチン	0.3%	116			
メチオニン・シスチン計	0.8%	323	379	258	170
フェニルアラニン	0.9%	356	271	178	
チロシン	0.7%	273			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	628	434	293	289
スレオニン	0.9%	356	253	170	190
トリプトファン	0.3%	102	83	55	63
バリン	1.1%	424	289	194	155
ヒスチジン	0.8%	333	112	75	71
アルギニン	1.2%	469	199	139	202

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（％）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	351	270	250	180	108	150
ロイシン	591	455	440	410	103	111
リジン	606	466	340	360	137	130
メチオニン・シスチン計	323	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	628	484	380	390	127	124
スレオニン	356	274	250	210	109	130
トリプトファン	102	79	60	70	131	112
バリン	424	326	310	220	105	148
ヒスチジン	333	256	-	120	-	214
全窒素量(g)	1.3					

