

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	354	217	140	136
ロイシン	1.6%	597	397	250	217
リジン	1.7%	624	199	129	232
メチオニン	0.6%	213	199	121	
シスチン	0.3%	113			
メチオニン・シスチン計	0.9%	330	379	239	158
フェニルアラニン	1.0%	354	271	166	
チロシン	0.8%	277			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	631	434	272	269
スレオニン	1.0%	362	253	158	177
トリプトファン	0.3%	104	83	52	59
バリン	1.2%	430	289	180	144
ヒスチジン	0.9%	343	112	70	66
アルギニン	1.4%	497	199	129	188

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（％）	
			1973年 （一般用）	1985年 （2-5歳）	1973年 （一般用）	1985年 （2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	354	261	250	180	104	145
ロイシン	597	440	440	410	100	107
リジン	624	460	340	360	135	128
メチオニン・シスチン計	330	243	220	160	110	152
フェニルアラニン・チロシン計	631	465	380	390	122	119
スレオニン	362	267	250	210	107	127
トリプトファン	104	76	60	70	127	109
バリン	430	317	310	220	102	144
ヒスチジン	343	253	-	120	-	211
全窒素量(g)	1.4					

